(Komunikasi Singkat) Studi Pembenihan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) Skala Rumah Tangga di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

(Short Communication) Study of the Hatchery of Tiger Grouper (*Epinephelus fuscoguttatus*) Household Scale in Penyabangan Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province

I Komang Yudha Wirawan¹, Liga Insani¹, Muhammad Sulaiman Dadiono^{2*}

¹ Politeknik Keautan dan Perikanan Jembrana, Pengambangan, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali

² Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Dr Soeparno, Komplek GOR Soesilo Soedarman, Karangwangkal, Karang Bawang, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

*Email: sdadiono@unsoed.ac.id

Received : 22 February 2020

Accepted : 27 March 2020

Publish : 31 April 2020

Abstrak

Pembenihan kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) skala rumah tangga merupakan salah satu penyumbang peningkatan produksi benih kerapu nasional. dengan adanya pembenihan kerapu skala rumah tangga permintaan akan benih kerapu bisa terpenuhi serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pembenihan kerapu macan skala rumah tangga yang meliputi penyediaan pakan, penetasan telur, pengelolaan kualitas air, pemanenan, *Hatching Rate* (HR) dan *Survival Rate* (SR). Metode pengambilan data dengan cara wawancara, observasi dan partisipasi aktif. Hasil observasi terkait pembenihan dimulai dengan penyediaan pakan alami hingga proses pemanenan benih berukuran 2,7-3 cm. *Hatching Rate* (HR) mencapai 80% dan *Survival Rate* (SR) mencapai 20%. Benih yang dihasilkan sebanyak 120.000 ekor/siklus. Hasil panen benih sebanyak 24.000 ekor/siklus.

Keyword : Pembenihan, Kerapu Macan, *Epinephelus fuscoguttatus*, Skala Rumah Tangga.

Abstract

Hatchery of tiger grouper (*Epinephelus fuscoguttatus*) household scale is one of the contributors to the increase in national grouper seed production. with the hatchery of household-scale grouper, the demand for grouper seed can be fulfilled as well as improving the community's economy. This study aims to determine the hatchery of household-scale tiger grouper which includes the provision of feed, hatching eggs, water quality management, harvesting, *Hatching Rate* (HR) and *Survival Rate* (SR). Data collection methods by interview, observation and active participation. Observation results related to seeding began with the provision of natural food to harvest the seeds measuring 2.7-3 cm. *Hatching Rate* (HR) reaches 80% and *Survival Rate* (SR) reaches 20%. The seeds produced were 120,000 per cycle. Seed yields are 24,000 per cycle.

Keyword : Hatchery, Tiger Grouper, *Epinephelus fuscoguttatus*, Household Scale

PENDAHULUAN

Masalah umum budidaya kerapu adalah cara mendapatkan benih unggul yang memiliki pertumbuhan yang cepat, FCR rendah, tahan terhadap perubahan lingkungan, tahan penyakit dan memiliki morfologi yang menarik. Salah satu jenis ikan kerapu yang disukai oleh pembudidaya kerapu di pesisir Bali Utara adalah jenis kerapu macan (Sutarmat dan Hirmawan, 2013). Kerapu macan (*Epinephelus fuscogutattus*) merupakan komoditas perikanan budidaya yang unggul, memiliki nilai ekonomis tinggi serta menjadi salah satu komoditas ekspor (Lutfiyah dan Budi, 2019).

Sepanjang pesisir pantai Bali Utara terdapat banyak pembudidaya kerapu macan mulai dari skala kecil maupun skala industri (Ismi *et al.*, 2012). Pembenihan kerapu macan (*E. fuscogutattus*) skala rumah tangga merupakan salah satu penyumbang peningkatan produksi benih kerapu nasional. dengan adanya pembenihan kerapu skala rumah tangga permintaan akan benih kerapu bisa terpenuhi serta meningkatkan perekonomian masyarakat Bali Utara. Tujuan studi ini untuk mengetahui

pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang meliputi penyediaan pakan, penetasan telur, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan benih, *Hatching Rate* (HR) dan *Survival Rate* (SR).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Studi ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 di “*Apri Hatchery*” yang terletak di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data studi ini dilakukan partisipasi aktif, wawancara dan observasi langsung di pembenihan kerapu macan yang masih tergolong skala rumah tangga di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selama bulan Oktober 2019.

Wawancara lebih ditekankan untuk mengambil data secara langsung kepada narasumber di lokasi. Pemeriksaan sampel udang vaname yang positif terinfeksi virus

kemudian dihitung dan dianalisa berdasarkan perhitungan matematik untuk mengetahui menilai prevalensi. Nilai prevalensi digunakan untuk mengetahui banyaknya udang yang terinfeksi virus. Prevalensi dapat dihitung menggunakan rumus menurut Cameron (2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakan alami yang digunakan pada pembenihan ikan kerapu macan adalah *Nannochloropsis*, *Rotifer*, *Artemia* dan rebon. Seluruh pakan

tersebut disediakan sesuai dengan umur dan jumlah larva ikan kerapu macan (Tabel 1). Selanjutnya, pakan buatan yang diaplikasikan pada larva menggunakan jenis pakan komersil dengan merk *Otohime* dengan 4 tipe pakan. Yaitu *Otohime* B1, *Otohime* B2, *Otohime* C1 dan *Otohime* S1. Pakan buatan diberikan untuk larva ketika memasuki umur 15 hari. Kandungan dari pakan merk *Otohime* tertera pada (Tabel 2).

Tabel 1. Pemberian pakan alami pada larva ikan kerapu macan

Umur (Hari)	Jenis Pakan	Frekuensi	Dosis
D0	-	-	-
D1	Makanan cadangan (kuning telur)	-	-
D2 – D14	<i>Nannochloropsis</i> <i>Rotifer</i>	2 kali sehari 2 kali sehari	1 jt sel/ml 300-500 individu/larva
D15 – D30	<i>Nannochloropsis</i> <i>Rotifer</i> <i>Artemia</i> Pakan buatan	2 kali sehari 2 kali sehari 2 kali sehari 3 – 4 kali sehari	1 jt sel/ml 300-500 individu/larva 30-40 individu/larva Ad-libitum
D31 – D40	<i>Rotifer</i> <i>Artemia</i> Pakan buatan Rebon	2 kali sehari 2 kali sehari 3 – 4 kali sehari 1 kali sehari	300-500 individu/larva 60-75 individu/larva Ad-libitum Ad-libitum
D41 – Panen	<i>Artemia</i> Pakan buatan Rebon	2 kali sehari 3 – 4 kali sehari 1 kali sehari	60-75 individu/larva Ad-libitum Ad-libitum

Tabel 2. Kandungan gizi pakan komersil merk *Otohime*

Tipe	Ukuran	Kandungan Gizi					Kemasan
		Protein % Min	Lemak % Min	Serat % Min	Abu % Min	Kalsium % Min	
B1	360 µm	50	10	3	16	2,3	2 kg/pak
B2	360-580 µm	50	10	3	16	2,3	2 kg/pak
C1	580-910 µm	50	10	3	16	2,3	2 kg/pak
S1	1,0 mm	50	10	3	16	2,3	2 kg/pak

Penetasan Telur

Telur kerapu macan yang ditebar pada bak penetasan dengan kepadatan 5 butir per liter dengan total jumlah tebar sebanyak 3 kantong yang berisi 150.000 butir. Telur diaklimatisasi selama 15 menit sebelum ditebar ke dalam bak penetasan. Telur kerapu macan menetas setelah 20 – 24 jam setelah pemijahan.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan Mayunar *et al.* (1991) secara keseluruhan, waktu inkubasi telur ikan kerapu macan berkisar antara 16 – 22 jam pada temperatur 28 – 30° C dan salinitas 32 – 34 ppt.

Pengelolaan Kualitas Air

Pergantian air dilakukan ketika larva kerapu macan memasuki

umur 15 hari (D15). Pergantian air dilakukan setiap satu hari sekali dengan pergantian sebanyak 20% – 50% dari volume air di dalam bak pemeliharaan larva.

Selain pergantian air, penyiponan juga dilakukan setiap hari ketika larva memasuki umur 17 hari (D17) hingga panen. Parameter kualitas air yang diukur selama pemeliharaan larva kerapu macan yaitu salinitas, pH, DO dan suhu pada bak pemeliharaan.

Hasil pengukuran tertera pada Tabel 3. Menurut Ismi *et al.* (2018), kualitas air pada bak pemeliharaan ikan kerapu haruslah terkontrol dengan suhu air antara 29 °C sampai 30 °C dengan perbedaan suhu maksimum dan minimum sebesar 1 °C-1,5 °C.

Tabel 3. Kualitas air pemeliharaan larva ikan kerapu macan

No	Parameter	Nilai	Optimal	Refrensi
1	Salinitas	35 ppt	28 - 33 ppt	Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2011
2	pH	7,4	7,5 - 8,5	
3	DO	6,5 ppm	Min. 4 ppm	
4	Suhu	29,4 °C	28 – 32° C	

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit merupakan faktor penentu untuk keberhasilan dalam usaha

pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

Buleleng, Provinsi Bali. Upaya yang dilakukan pada usaha pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Buleleng untuk mencegah timbulnya penyakit dengan pemberian obat *elbayou* yang dilarutkan pada artemia yang akan diberikan kepada larva.

Dosis pemberian *elbayou* yaitu sebanyak 10 ppm. Sedangkan berdasarkan studi yang dilakukan Widyawan (2006) upaya pencegahan penyakit pada pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Situbondo dilakukan dengan pemberian *Elbasin* sebanyak 0,25 ppm dan *Malacyte Green* sebanyak 0,1 ppm. Berarti upaya pencegahan penyakit pada usaha pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Buleleng lebih sederhana jika dibandingkan upaya yang dilakukan pada pembenihan kerapu macan skala rumah tangga di Situbondo.

Panen Benih

Pemanenan benih kerapu macan dilakukan ketika benih memiliki panjang antara 2,7 – 3 cm. Pada umumnya benih mencapai ukuran tersebut pada saat benih memasuki umur 40 – 45 hari (D40 – D45). Selain untuk menghitung

jumlah, panen juga bertujuan untuk menyeleksi ukuran sehingga tidak terjadi kanibalisme. Panen dilakukan dengan cara mengurangi volume air bak hingga mencapai ketinggian 30 cm.

Benih digiring ke sudut bak kemudian diseser secara perlahan dan dipindahkan ke tempat *grading* untuk menyesuaikan ukuran dan kondisi fisik yang baik. Kondisi fisik yang baik yaitu tidak adanya luka dan cacat fisik. Pernyataan ini sesuai dengan SNI (2011) dimana bentuk tubuh benih normal, lengkap, serta tidak tampak kelainan genetik.

Analisa Produksi

Analisa produksi yang dimaksud diantaranya yaitu *Hatching Rate* (HR) dan *Survival Rate* (SR).

Hatching Rate (HR)

HR (Hatching Rate) adalah daya tetas telur berdasarkan jumlah telur yang ditebar dengan jumlah telur yang menetas. Penghitungan HR dilakukan dengan pengambilan sampel setelah telur menetas dengan menggunakan beaker glass. Setelah diambil, kemudian dihitung dan dikalkulasikan dengan volume bak penetasan sehingga memperoleh

hasil 80% atau sebanyak 120.000 larva yang menetas dari 150.000 butir telur yang ditebar.

Survival Rate (SR)

SR (Survival Rate) merupakan tingkat kelulus hidupan benih ikan kerapu macan selama pemeliharaan. SR diperoleh setelah pemanenan benih berdasarkan jumlah benih yang diperoleh. SR Pada siklus sebelumnya mencapai 20%, jadi benih yang diperoleh pada siklus sebelumnya yaitu sebanyak 24.000 ekor benih kerapu macan. SR dipengaruhi banyak faktor, termasuk padat tebar yang terlalu tinggi (Faruq *et al.*, 2019).

KESIMPULAN

Pembenihan ikan kerapu macan skala rumah tangga di “Apri Hatchery” yang terletak di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dimulai dari persiapan bak penetasan, penebaran dan penetasan telur, pemeliharaan larva hingga panen. Teknik pemijahan yang dilakukan di “Apri Hatchery” tergolong pemijahan alami, karena menurut Apri, Indukan kerapu macan menghasilkan telur yang lebih

berkualitas apabila dilakukan secara alami. Pengendalian penyakit dilakukan dengan pemberian obat *elbayou* yang dilarutkan pada artemia yang akan diberikan kepada larva dengan dosis pemberian *elbayou* sebesar 10 ppm. Hasil produksi pada pembenihan kerapu macan skala rumah tangga pada siklus sebelumnya mampu menghasilkan 24.000 ekor benih ikan kerapu macan dengan SR 20%. Dengan harga jual Rp 1.300 per ekor benih ukuran 2,7 – 3 cm.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Apri selaku pemilik “Apri Hatchery” sebagai usaha pembenihan kerapu macan skala rumah tangga yang dijadikan tempat studi, para taruna dan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang telah mendukung penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Faruq, U., R. Jumadi, M. S. Dadiono. 2019. Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Ikan Bandeng (*Chanos chanos*). Jurnal Perikanan Pantura, 2(1): 10-16. DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jp.p.v2i1.806>.

- Ismi, S., T. Sutarmat, N.A. Giri, M.A. Rimmer, R.M.J. Knuckey, A.C. Berding, K. Sugama. 2012. Nursery management of grouper: a best-practice manual. ACIAR Monograph No. 150. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra.
- Ismi, S., J. H. Hutapea, D. Kusumawati, Y. N. Asih. 2018. Perkembangan Morfologi dan Perilaku Larva Ikan Kerapu Hibrida Cantik pada Produksi Massal. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 10(2): 431-440. DOI:<http://dx.doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.21825>.
- Lutfiyah, L., D. S. Budi. 2019. Fluctuation of Asymmetry of Hybrid Cantang Grouper (*Epinephelus fuscoguttatus* x *Epinephelus lanceolatus*) Originating from Situbondo and Bali. Journal of Aquaculture Science, 4(1): 21-26. DOI:<https://doi.org/10.31093/joas.v4i1.65>.
- Mayunar, S. Diani, B. Slamet. 1991. Fekunditas, derajat pembuahan dan derajat penetasan telur ika kerapu macan, *Epinephelus fuscoguttatus* yag diberi ransum berbeda. Jurnal Peneliti Budidaya Pantai, 7(2): 1-9.
- Sutarmat, T. dan Hirmawan T.Y. 2013. Analisis keragaan pertumbuhan benih ikan kerapu hasil hibridisasi kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) dengan kerapu kertang (*Epinephelus lanceolatus*) dan kerapu batik (*Epinephelus microdon*). Jurnal Riset Akuakultur, 8(3): 363-372.
- SNI. 2011. Ikan kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Foskal) – Bagian 2: Benih kerapu macan. BSN. Jakarta.
- Widyawan, MRH. 2006. Teknik Pembenihan Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) Skala Rumah Tangga di Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur [PKL]. Surabaya (ID): Universitas Airlangga.